微分入門 (1)

前田利之 (まえだ としゆき)
maechan@hannan-u.ac.jp

阪南大学

(2024.10.16)

なぜ微分を勉強するか？

- ☆… だから（後期の準備、詳細は別途解説）
- 分析（最小二乗法、は前期にやった）
- 関数（ニューラルネットの重要な要素）
- 関数
（ニューラルネット、特に 等で重要な要素）

なぜ微分を勉強するか？

☆… **必要** だから（後期の準備、詳細は別途解説）

- 分析（最小二乗法、は前期にやった）
- 関数（ニューラルネットの重要な要素）
- 関数
（ニューラルネット、特に 等で重要な要素）

なぜ微分を勉強するか？

- ☆… **必要** だから（後期の準備、詳細は別途解説）
- **回帰** 分析（最小二乗法、は前期にやった）
- 関数（ニューラルネットの重要な要素）
- 関数
（ニューラルネット、特に 等で重要な要素）

なぜ微分を勉強するか？

- ☆… **必要** だから（後期の準備、詳細は別途解説）
- **回帰** 分析（最小二乗法、は前期にやった）
 - **シグモイド** 関数（ニューラルネットの重要な要素）
 - 関数
（ニューラルネット、特に 等で重要な要素）

なぜ微分を勉強するか？

- ☆… **必要** だから（後期の準備、詳細は別途解説）
- **回帰** 分析（最小二乗法、は前期にやった）
 - **シグモイド** 関数（ニューラルネットの重要な要素）
 - **ハイパボリック・タンジェント** 関数
（ニューラルネット、特に 等で重要な要素）

なぜ微分を勉強するか？

- ☆… **必要** だから（後期の準備、詳細は別途解説）
- **回帰** 分析（最小二乗法、は前期にやった）
 - **シグモイド** 関数（ニューラルネットの重要な要素）
 - **ハイパボリック・タンジェント** 関数
（ニューラルネット、特に **深層学習** 等で重要な要素）

そもそも「微分」って何？

- ある瞬間の
- 関数（のグラフ）の場合は、各点における傾き =
- ... では

そもそも「微分」って何？

- ある瞬間の **変化率**
- 関数（のグラフ）の場合は、各点における傾き =
- ... では

そもそも「微分」って何？

- ある瞬間の **変化率**
- 関数（のグラフ）の場合は、各点における傾き = **変化の割合**
- ... では

そもそも「微分」って何？

- ある瞬間の **変化率**
- 関数（のグラフ）の場合は、各点における傾き = **変化の割合**
- ... では **分りにくい（?!）**

微分の素朴な説明

- 1 数直線上の**位置**を考える
- 2 目盛がきざんであるとする（マイナスから0を経てプラスへ）
- 3 いま、0地点に点Pがあるとする
- 4 Pが動くと位置が変わる
- 5 位置の変化＝

微分の素朴な説明

- 1 数直線上の**位置**を考える
- 2 目盛がきざんであるとする（マイナスから0を経てプラスへ）
- 3 いま、0地点に点Pがあるとする
- 4 Pが動くと位置が変わる
- 5 位置の変化＝

変化後の位置－変化前の位置

位置の変化

位置の変化

位置の変化

位置の変化

位置の変化

- $0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3$, いずれも変化は1 (当然)

微分の素朴な説明（続き）

- 6 次に、位置とあわせて時刻も考えることにする
- 7 時刻の変化 = 変化後の時刻 - 変化前の時刻
- 8 すると、が計算できて、

$$\begin{aligned} \text{位置の変化} &= \frac{\text{位置の変化}}{\text{時刻の変化}} \\ &= \frac{\text{変化後の位置} - \text{変化前の位置}}{\text{変化後の時刻} - \text{変化前の時刻}} \end{aligned}$$

微分の素朴な説明（続き）

- 次に、位置とあわせて時刻も考えることにする
- 時刻の変化 = 変化後の時刻 - 変化前の時刻
- すると、**速度**が計算できて、

$$\begin{aligned} \square &= \frac{\text{位置の変化}}{\text{時刻の変化}} \\ &= \frac{\text{変化後の位置} - \text{変化前の位置}}{\text{変化後の時刻} - \text{変化前の時刻}} \end{aligned}$$

微分の素朴な説明（続き）

- 次に、位置とあわせて時刻も考えることにする
- 時刻の変化 = 変化後の時刻 - 変化前の時刻
- すると、**速度**が計算できて、

$$\begin{aligned} \text{速度} &= \frac{\text{位置の変化}}{\text{時刻の変化}} \\ &= \frac{\text{変化後の位置} - \text{変化前の位置}}{\text{変化後の時刻} - \text{変化前の時刻}} \end{aligned}$$

速度

速度

速度

速度

速度

- 1秒ごとに $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, と進んだとすると...

速度

- 1秒ごとに $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, と進んだとすると…
- 速度は全て **1 (!)**
…本当は単位がある (メートル/秒、等)

時間と位置

時間と位置

時間と位置

時間と位置

時間と位置

時間と位置

- 毎秒 $0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 2, \dots$ と進んだ 、即ち は全て 1

(前の数直線に時間座標を加えて2次元グラフにした)

時間と位置

- 毎秒 $0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 2, \dots$ と進んだ **傾き**、即ち は全て 1

(前の数直線に時間座標を加えて2次元グラフにした)

時間と位置

- 毎秒 $0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 2, \dots$ と進んだ **傾き**、即ち **速度** は全て 1

(前の数直線に時間座標を加えて2次元グラフにした)

時間と速度

- 縦軸を速度とすると…

時間と速度

- 縦軸を速度とすると…

時間と速度

- 縦軸を**速度**とすると…

時間と速度

- 縦軸を**速度**とすると…

時間と速度

- 縦軸を**速度**とすると…

時間と速度

- 縦軸を**速度**とすると…

時間と速度

- 縦軸を**速度**とすると…

時間と速度

- 縦軸を**速度**とすると…

- 何秒たっても**速度は一定**（前のグラフの縦座標を**位置**から**速度**に変えただけ）

微分の素朴な説明

- 「微分する」とは言ってみれば

から

を得ること

- **速度** = $\frac{\text{位置の変化}}{\text{時刻の変化}}$ (再掲)

- 今の場合は速度が一定なので、

はどの瞬間でも、つまりいつでも同じ、ということ

☆ **等速度運動は単純**

微分の素朴な説明

- 「微分する」とは言ってみれば
「位置のグラフ」から
を得ること

- $\text{速度} = \frac{\text{位置の変化}}{\text{時刻の変化}}$ (再掲)

- 今の場合速度が一定なので、
はどの瞬間でも、つまり
いつでも同じ、ということ

☆等速度運動は単純

微分の素朴な説明

- 「微分する」とは言ってみれば
「位置のグラフ」から
「速度のグラフ」を得ること

- $$\text{速度} = \frac{\text{位置の変化}}{\text{時刻の変化}}$$
 (再掲)

- 今の場合速度が一定なので、
 ほどの瞬間でも、つまり
いつでも同じ、ということ

☆等速度運動は単純

微分の素朴な説明

- 「微分する」とは言ってみれば

「位置のグラフ」から

「速度のグラフ」を得ること

- $$\text{速度} = \frac{\text{位置の変化}}{\text{時刻の変化}} \quad (\text{再掲})$$

- 今の場合速度が一定なので、
瞬間の変化率はどの瞬間でも、つまり
いつでも同じ、ということ

☆ 等速度運動は単純

等速度の微分

微分の素朴な説明（２）

- では、ということで、等速度運動じゃない場合を考える
- 例えば : 物を落とすと（空気抵抗がない条件では）時間がたつと、その2乗でスピードが早くなる
- 便宜的（？）に、下向きではなく上向きに位置を考える→

微分の素朴な説明（２）

- では、ということで、等速度運動じゃない場合を考える
- 例えば **放物線**：物を落とすと（空気抵抗がない条件では）時間がたつと、その2乗でスピードが早くなる
- 便宜的（？）に、下向きではなく上向きに位置を考える→

微分の素朴な説明（2）

- では、ということで、等速度運動じゃない場合を考える
- 例えば **放物線**：物を落とすと（空気抵抗がない条件では）時間がたつと、その2乗でスピードが早くなる
- 便宜的（？）に、下向きではなく上向きに位置を考える→ $y = x^2$

微分の素朴な説明（続き）

$y = x^2$ （黒線）の傾きを考えると

- $x = 0, 1$ の間の傾き、すなわち

は 1.0 (赤)

- $x = 0.5, 1$ の間の傾きは 1.5 (緑)

- と、だんだん間隔を詰めていくと…

- $x = 1$ での間の傾き、すなわち

は 2.0 (青) →
これが $x = 1$ での微分の値

微分の素朴な説明（続き）

$y = x^2$ （黒線）の傾きを考えると

- $x = 0, 1$ の間の傾き、すなわち

平均の速度 は 1.0 (赤)

- $x = 0.5, 1$ の間の傾きは 1.5 (緑)

- と、だんだん間隔を詰めていくと…

- $x = 1$ での間の傾き、すなわち

は 2.0 (青) →
これが $x = 1$ での微分の値

微分の素朴な説明（続き）

$y = x^2$ （黒線）の傾きを考えると

- $x = 0, 1$ の間の傾き、すなわち

平均の速度 は 1.0 (赤)

- $x = 0.5, 1$ の間の傾きは 1.5 (緑)

- と、だんだん間隔を詰めていくと…

- $x = 1$ での間の傾き、すなわち

瞬間の速度 は 2.0 (青) →
これが $x = 1$ での微分の値

微分の素朴な説明（続き）

$y = x^2$ （黒線）の傾きを考えると

- $x = 0, 1$ の間の傾き、すなわち

平均の速度 は 1.0 (赤)

- $x = 0.5, 1$ の間の傾きは 1.5 (緑)

- と、だんだん間隔を詰めていくと…

- $x = 1$ での間の傾き、すなわち

瞬間の速度 は 2.0 (青) →
これが $x = 1$ での微分の値

(微分係数)

微分 (続き)

微分 (続き)

微分 (続き)

微分 (続き)

微分（続き）

- 速度は直線的に増えている

微分（続き）

- 速度は直線的に増えている
- ちなみに、速度も微分できる→加速度

微分（続き）

- 微小な間隔を Δ とすると、その変化は

$$\frac{x^2 - (x - \Delta)^2}{\Delta} = \frac{x^2 - x^2 + 2x\Delta - \Delta^2}{\Delta} = \frac{2x\Delta - \Delta^2}{\Delta} = 2x - \Delta$$

- Δ を無限に小さくできるので無視すると、結局 だけが残る
- なので、 $x = 1$ のときの微分係数は となる

微分（続き）

- 微小な間隔を Δ とすると、その変化は

$$\begin{aligned}\frac{x^2 - (x - \Delta)^2}{\Delta} &= \frac{x^2 - x^2 + 2x\Delta - \Delta^2}{\Delta} = \\ &= \frac{2x\Delta - \Delta^2}{\Delta} = 2x - \Delta\end{aligned}$$

- Δ を無限に小さくできるので無視すると、結局 $2x$ だけが残る
- なので、 $x = 1$ のときの微分係数は となる

微分（続き）

- 微小な間隔を Δ とすると、その変化は

$$\frac{x^2 - (x - \Delta)^2}{\Delta} = \frac{x^2 - x^2 + 2x\Delta - \Delta^2}{\Delta} = \frac{2x\Delta - \Delta^2}{\Delta} = 2x - \Delta$$

- Δ を無限に小さくできるので無視すると、結局 $2x$ だけが残る
- なので、 $x = 1$ のときの微分係数は $2 \times 1 = 2$ となる

微分（続き）

- つまり x^2 の微分 だ、ということ
- このように、 と、関数に をつけて微分（これも関数… と呼ぶ）をあらわす
- 別の表記として、 のように、どの変数にたいして微分したかを明示する記法もある…偏微分では重要（後述）

微分（続き）

- つまり x^2 の微分 $(x^2)' = 2x$ だ、ということ
- このように、 と、関数に をつけて微分（これも関数… と呼ぶ）をあらわす
- 別の表記として、 のように、どの変数にたいして微分したかを明示する記法もある…偏微分では重要（後述）

微分（続き）

- つまり x^2 の微分 $(x^2)' = 2x$ だ、ということ
- このように、 $(x^2)'$ と、関数に をつけて微分（これも関数… と呼ぶ）をあらわす
- 別の表記として、 のように、どの変数にたいして微分したかを明示する記法もある…偏微分では重要（後述）

微分（続き）

- つまり x^2 の微分 $(x^2)' = 2x$ だ、ということ
- このように、 $(x^2)'$ と、関数に ' (dash) をつけて微分（これも関数… と呼ぶ）をあらわす
- 別の表記として、 のように、どの変数にたいして微分したかを明示する記法もある…偏微分では重要（後述）

微分（続き）

- つまり x^2 の微分 $(x^2)' = 2x$ だ、ということ
- このように、 $(x^2)'$ と、関数に ' (dash) をつけて微分（これも関数… **導関数** と呼ぶ）をあらわす
- 別の表記として、 のように、どの変数にたいして微分したかを明示する記法もある…偏微分では重要（後述）

微分（続き）

- つまり x^2 の微分 $(x^2)' = 2x$ だ、ということ
- このように、 $(x^2)'$ と、関数に ' (dash) をつけて微分（これも関数… 導関数 と呼ぶ）をあらわす
- 別の表記として、 $\frac{d}{dx}x^2$ のように、どの変数にたいして微分したかを明示する記法もある…偏微分では重要（後述）

微分して何が嬉しい？

- 値を求めるときに使う
 - と最大／最小は違うことに注意（後の3次関数で説明）
- なぜ微分で がわかるか？
- x^2 の微分は $2x$ だ、ということは、
 - $x < 0$ のとき、 $2x$ = グラフの傾きはマイナス = 値は減少
 - $x = 0$ のとき、 $2x$ は 0 = 極小（2次関数だと、最小）
 - $x > 0$ のとき、 $2x$ はプラス = 値は増加
- つまり のところが
（最大／最小の可能性）

微分して何が嬉しい？

- **極大／極小** 値を求めるときに使う
 - と最大／最小は**違う**ことに注意（後の3次関数で説明）
- なぜ微分で がわかるか？
- x^2 の微分は $2x$ だ、ということは、
 - $x < 0$ のとき、 $2x$ = グラフの傾きはマイナス = 値は減少
 - $x = 0$ のとき、 $2x$ は 0 = 極小（2次関数だと、最小）
 - $x > 0$ のとき、 $2x$ はプラス = 値は増加
- つまり のところが
（最大／最小の可能性）

微分して何が嬉しい？

- **極大／極小** 値を求めるときに使う
 - **極大／極小** と最大／最小は **違う** ことに注意（後の3次関数で説明）
- なぜ微分で がわかるか？
- x^2 の微分は $2x$ だ、ということは、
 - $x < 0$ のとき、 $2x$ = グラフの傾きはマイナス = 値は減少
 - $x = 0$ のとき、 $2x$ は 0 = 極小（2次関数だと、最小）
 - $x > 0$ のとき、 $2x$ はプラス = 値は増加
- つまり のところが
（最大／最小の可能性）

微分して何が嬉しい？

- **極大／極小** 値を求めるときに使う
 - **極大／極小** と最大／最小は **違う** ことに注意（後の3次関数で説明）
- なぜ微分で **極大／極小** がわかるか？
- x^2 の微分は $2x$ だ、ということは、
 - $x < 0$ のとき、 $2x$ = グラフの傾きはマイナス = 値は減少
 - $x = 0$ のとき、 $2x$ は 0 = 極小（2次関数だと、最小）
 - $x > 0$ のとき、 $2x$ はプラス = 値は増加
- つまり のところが
（最大／最小の可能性）

微分して何が嬉しい？

- **極大／極小** 値を求めるときに使う
 - **極大／極小** と最大／最小は**違う**ことに注意（後の3次関数で説明）
- なぜ微分で **極大／極小** がわかるか？
- x^2 の微分は $2x$ だ、ということは、
 - $x < 0$ のとき、 $2x$ = グラフの傾きはマイナス = 値は減少
 - $x = 0$ のとき、 $2x$ は 0 = 極小（2次関数だと、最小）
 - $x > 0$ のとき、 $2x$ はプラス = 値は増加
- つまり **微分係数が 0** のところが
（最大／最小の可能性）

微分して何が嬉しい？

- **極大／極小** 値を求めるときに使う
 - **極大／極小** と最大／最小は**違う**ことに注意（後の3次関数で説明）
- なぜ微分で **極大／極小** がわかるか？
- x^2 の微分は $2x$ だ、ということは、
 - $x < 0$ のとき、 $2x$ = グラフの傾きはマイナス = 値は減少
 - $x = 0$ のとき、 $2x$ は 0 = 極小（2次関数だと、最小）
 - $x > 0$ のとき、 $2x$ はプラス = 値は増加
- つまり **微分係数が 0** のところが **極大／極小**（最大／最小の可能性）

微分の性質

- $\{a \cdot f(x)\}' = a \cdot f(x)'$

... 関数の定数倍は、微分の外に出せる

- $\{f(x) + g(x)\}' = f(x)' + g(x)'$

... 多項式の場合は各項を微分すればいい

- $(x^n)' = nx^{n-1}$... 整式の単項の微分（基本中の基本）

... 「微分の線形性」を表している（詳細略）

2次関数の例

たとえば $y = x^2 - 4x + 3$ だと、

- $y = 0$ との交点、すなわち

は
1, 3

- $y' = (x^2)' - 4(x)' + (3)' = 2x - 4$
となる（前の性質より）

- 最小値をもつのは $y' = 2x - 4 = 0$
となるとき $\rightarrow x = 2$

- これは、
 $y = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1$ で
 で最小というのと完全
に一致している（！）

2次関数の例

たとえば $y = x^2 - 4x + 3$ だと、

- $y = 0$ との交点、すなわち

$x^2 - 4x + 3 = 0$ の解は
1, 3

- $y' = (x^2)' - 4(x)' + (3)' = 2x - 4$
となる（前の性質より）

- 最小値をもつのは $y' = 2x - 4 = 0$
となるとき $\rightarrow x = 2$

- これは、
 $y = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1$ で
 で最小というのと完全
に一致している（!）

2次関数の例

たとえば $y = x^2 - 4x + 3$ だと、

- $y = 0$ との交点、すなわち

$x^2 - 4x + 3 = 0$ の解は
1, 3

- $y' = (x^2)' - 4(x)' + (3)' = 2x - 4$
となる（前の性質より）

- 最小値をもつのは $y' = 2x - 4 = 0$
となるとき $\rightarrow x = 2$

- これは、
 $y = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1$ で
 $x = 2$ で最小というのと完全
に一致している（!）

単項の微分

たとえば x^3 だと、

- 微小な間隔を Δ とすると、その変化は

$$\begin{aligned}\frac{x^3 - (x - \Delta)^3}{\Delta} &= \frac{x^3 - x^3 + 3x^2\Delta - 3x\Delta^2 + \Delta^3}{\Delta} \\ &= \frac{3x^2\Delta - 3x\Delta^2 + \Delta^3}{\Delta} = 3x^2 - \Delta(3x - \Delta)\end{aligned}$$

- Δ を無限に小さくできるので2項目以降は無視すると、結局 だけが残る

単項の微分

たとえば x^3 だと、

- 微小な間隔を Δ とすると、その変化は

$$\begin{aligned}\frac{x^3 - (x - \Delta)^3}{\Delta} &= \frac{x^3 - x^3 + 3x^2\Delta - 3x\Delta^2 + \Delta^3}{\Delta} \\ &= \frac{3x^2\Delta - 3x\Delta^2 + \Delta^3}{\Delta} = 3x^2 - \Delta(3x - \Delta)\end{aligned}$$

- Δ を無限に小さくできるので2項目以降は無視すると、結局 $3x^2$ だけが残る

単項の微分

- 一般に x^n とすると、その変化は:

$$\begin{aligned}\frac{x^n - (x - \Delta)^n}{\Delta} &= \frac{x^n - x^n + nx^{n-1}\Delta - \binom{n}{2}x^{n-2}\Delta^2 + \dots}{\Delta} \\ &= \frac{nx^{n-1}\Delta - \binom{n}{2}x^{n-2}\Delta^2 + \dots}{\Delta} \\ &= nx^{n-1} - \Delta\left(\binom{n}{2}x^{n-2} + \dots\right)\end{aligned}$$

単項の微分

- Δ を無限に小さくできるので2項目以降
($\Delta(\binom{n}{2}x^{n-2} + \dots)$) は無視すると、結局 だけが残る
- …要するに x の になって出て
 イメージ (詳細略)

単項の微分

- Δ を無限に小さくできるので2項目以降
($\Delta(\binom{n}{2}x^{n-2} + \dots)$) は無視すると、結局 nx^{n-1} だけが残る
- …要するに x の になって出て
 イメージ (詳細略)

単項の微分

- Δ を無限に小さくできるので2項目以降
($\Delta(\binom{n}{2}x^{n-2} + \dots)$) は無視すると、結局 nx^{n-1} だけが残る
- …要するに x の **次数が係数** になって出て
 イメージ (詳細略)

単項の微分

- Δ を無限に小さくできるので2項目以降
($\Delta(\binom{n}{2}x^{n-2} + \dots)$) は無視すると、結局 nx^{n-1} だけが残る
- …要するに x の **次数が係数** になって出て
次数自体は1つ減る イメージ (詳細略)

多項式の例

たとえば $y = x^3 - 3x$ だと、

- 極大 or 小値をもつのは
 $y' = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) =$
 $3(x - 1)(x + 1)$ となり $x = -1, 1$
で $y' = 0$

- $x = -1$ で極大値、 $x = 1$ で極小値を持つ

- ではないことに
注意！
関数としての最大は ∞ 、
最小は $-\infty$

多項式の例

たとえば $y = x^3 - 3x$ だと、

- 極大 or 小値をもつのは
 $y' = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) =$
 $3(x - 1)(x + 1)$ となり $x = -1, 1$
で $y' = 0$

- $x = -1$ で極大値、 $x = 1$ で極小値を持つ

- **最大・最小** ではないことに注意！
関数としての最大は ∞ 、
最小は $-\infty$

多項式の例題

◎以下の小問を解いてください（必ずまず自分で考えて、それから答えを見てください！）

1 $f(x) = x^2 + 2x - 3$ の導関数は

2 $x = -1$ のとき, $f(x) = x^2 + 2x - 3$ の微分係数は

3 $f(x) = x^4$ の導関数は

4 $x = 1$ のとき, $f(x) = x^4$ の微分係数は

多項式の例題

◎以下の小問を解いてください（必ずまず自分で考えて、それから答えを見てください！）

1 $f(x) = x^2 + 2x - 3$ の導関数は

$$f'(x) = 2x + 2 = 2(x + 1)$$

2 $x = -1$ のとき, $f(x) = x^2 + 2x - 3$ の微分係数は

3 $f(x) = x^4$ の導関数は

4 $x = 1$ のとき, $f(x) = x^4$ の微分係数は

多項式の例題

◎以下の小問を解いてください（必ずまず自分で考えて、それから答えを見てください！）

1 $f(x) = x^2 + 2x - 3$ の導関数は

$$f'(x) = 2x + 2 = 2(x + 1)$$

2 $x = -1$ のとき, $f(x) = x^2 + 2x - 3$ の微分係数は

$$f'(-1) = 2 \times (-1 + 1) = 0$$

3 $f(x) = x^4$ の導関数は

4 $x = 1$ のとき, $f(x) = x^4$ の微分係数は

多項式の例題

◎以下の小問を解いてください（必ずまず自分で考えて、それから答えを見てください！）

1 $f(x) = x^2 + 2x - 3$ の導関数は

$$f'(x) = 2x + 2 = 2(x + 1)$$

2 $x = -1$ のとき, $f(x) = x^2 + 2x - 3$ の微分係数は

$$f'(-1) = 2 \times (-1 + 1) = 0$$

3 $f(x) = x^4$ の導関数は $f'(x) = 4x^3$

4 $x = 1$ のとき, $f(x) = x^4$ の微分係数は

多項式の例題

◎以下の小問を解いてください（必ずまず自分で考えて、それから答えを見てください！）

1 $f(x) = x^2 + 2x - 3$ の導関数は

$$f'(x) = 2x + 2 = 2(x + 1)$$

2 $x = -1$ のとき, $f(x) = x^2 + 2x - 3$ の微分係数は

$$f'(-1) = 2 \times (-1 + 1) = 0$$

3 $f(x) = x^4$ の導関数は $f'(x) = 4x^3$

4 $x = 1$ のとき, $f(x) = x^4$ の微分係数は

$$f'(1) = 4 \times 1^3 = 4$$

余談：整関数とは

- 俗にいう（高校の教科書にある？）整関数とは…
 $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ の形で書ける関数
（右辺を整式と呼ぶ）
- でも本当は、↑は
と呼ぶべきもの
- 本当の整関数は、複素関数論のもの（ややこしいので略）

余談：整関数とは

- 俗にいう（高校の教科書にある？）整関数とは…
 $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ の形で書ける関数
（右辺を整式と呼ぶ）
- でも本当は、↑は **（1変数）多項式関数**
と呼ぶべきもの
- 本当の整関数は、複素関数論のもの（ややこしいので略）

おしまい

質問があれば、お気軽に！